Tu tires ou tu pousse?

Dynamiques de propagation dans un système expérimental hôte-parasitoïde

Illustration: L. Lamy

M. Haond¹, T. Morel-Journel¹, A. Bertin¹, S. Fellous², V. Calcagno¹, E. Lombaert¹, L. Mailleret¹, L. Roques³, E. Vercken¹

¹ ISA, Sophia Antipolis

² CBGP, Montpellier

³ BioSP, Avignon

Journée Maths-Bio 2017, 4 décembre, Université Paris Dauphine

Invasions biologiques

= Introduction d'organismes dans une nouvelle aire géographique où ils prolifèrent et se répandent

(Mack et al. 2000, *Ecol. Appl.*)

ECOLOGIQUE

Caulerpa taxifolia

SANITAIRE

Aedes albopictus

ENJEUX

ECONOMIQUE

Dryocosmus kuriphilus

Torymus sinensis

La lutte biologique: une invasion planifiée

Biologie des populations introduites

Détermination des facteurs de succès/d'échec des invasions biologiques

Etapes d'une invasion

Nb individus
Diversité génétique
Purge allèles délétères
Sélection

Facteurs intrinsèques « pop »

Habitat matching
Enemy release
Compétition
Structure spatiale???

Facteurs extrinsèques « milieu »

Impact de la structure spatiale de la zone d'introduction

Thèse de Thibaut Morel-Journel (2012-2015) co-encadré avec L. Mailleret

« stratégies d'introduction d'organismes dans un environnement spatialement structuré »

=> Approche centrée sur l'utilisation de microcosmes expérimentaux, couplés à des modèles par simulations

Biologie des populations introduites

Prédiction essentielle: rôle de l'émigration dans extinctions précoces de petites pops

=> Lewis & Kareiva 1993; Kean & Barlow 2000; Kanarek et al. 2013

Problème: pas observé dans nos manip!

Pattern de colonisation

(Robinet and Liebhold 2009, *Ecol. Appl.*)

**Front de colonisation
poussé: mais qu'est-
ce que c'est?!**

Modèles de réaction-diffusion

Classe de modèles la plus utilisée pour représenter les phénomènes de colonisation

Structure générale

$$\frac{\partial U}{\partial t}(t, x) = \underbrace{\frac{\partial^2}{\partial x^2} (D(U) U)}_{\text{opérateur de dispersion}} + \underbrace{f(U)}_{\text{terme de croissance}}$$

Solution particulières: **vagues de propagation**

- Vitesse constante c
- Profil constant $U = \text{front}$

Vagues de propagation

Très utilisées pour étudier les phénomènes de propagation, car permettent de relier la vitesse de propagation c aux paramètres du modèle ($r, D, \dots$)

(d'après Skellam 1951 *Biometrika*)

(Giometto et al. 2014 *PNAS*)

Vagues tirées et vagues poussées

Calcul de la vitesse d'un front (Stokes 1976 *Math Biosci*):

- Cas classique (Fisher-KPP): linéarisation du modèle au voisinage de $U=0$
=> la vitesse dépend de la dynamique **à faible densité**
=> **vague tirée (par le front)**
- Autres cas: linéarisation pas possible
=> la vitesse dépend de la dynamique de l'ensemble de la population
=> **vague poussée (par le cœur)**

Profil de front de propagation

Limites de la définition: certaines classes de modèles; stochasticité

=> Besoin de construire des indicateurs empiriques robustes

Mécanismes écologiques

Avérés au sens de Stokes (vitesse non linéaire):

- Effet Allee fort (Stokes 1976)
- Compétition (Roques et al. 2015 *J Math Biol*)

Avérés selon un autre critère (diversité génétique):

- Expansion en réponse à un changement climatique (Garnier & Lewis 2016 *Bull Math Biol*)

Point commun: **difficultés de colonisation à faible densité?**

Autres mécanismes (Haond et al. in prep):

- Dispersion densité-dépendante positive

Mécanismes écologiques

Avérés au sens de Stokes (vitesse non linéaire):

- Effet Allee fort (Stokes 1976)
- Compétition (Roques et al. 2015 *J Math Biol*)

Avérés selon un autre critère (diversité génétique):

- Expansion en réponse à un changement climatique (Garnier & Lewis 2016 *Bull Math Biol*)

Point commun: **difficultés de colonisation à faible densité?**

Autres mécanismes (Haond et al. in prep):

- Dispersion densité-dépendante positive
- Stochasticité de dispersion

Différentes approches complémentaires

Modèles de réaction-diffusion: la base théorique

- analyse « mathématique »: linéarisation, calcul des vitesses, etc
- simulation des solutions: Comsol Multiphysics

Modèle individu-centré: déviations / conditions théoriques

Différentes approches complémentaires

Systeme expérimental: ce que ça donne dans la « vraie vie »

Centre de Ressources Biologiques: banque de populations de trichogrammes avec caractéristiques d'histoire de vie différentes

Objectifs généraux du projet

1. Valider mécanismes

Dispersion DD+?

Stochasticité de dispersion?

Dispersion à longue distance / stratifiée?

2. Explorer conséquences

Patron de propagation: vitesse, sensibilité à l'hétérogénéité du milieu?

Dynamique de la diversité génétique: neutre, sélectionnée?

3. Définir indicateurs empiriques

Critères pour caractériser les dynamiques tirée vs poussée applicables en pratique

Critère quantitatif: niveau de poussitude?

⇒ Unifier théorie et pratique: différentes définitions, différents mécanismes

⇒ Un processus commun? (ou pas?)

Impact de la qualité du milieu sur la vitesse

En réaction-diffusion « classique », nombreuses études sur l'impact de variations spatiales du taux de croissance r sur la vitesse

Shigesada & Kawasaki 1997

Neubert et al. 2000 Proc B

A contrario, pas de résultat sur impact de K?

Modèle de base (Fisher-KPP):
$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + ru \left(1 - \frac{u}{K}\right)$$

$$v = 2\sqrt{rD}$$

=> Extrapolation +/- implicite à l'ensemble des dynamiques de propagation

Impact de la qualité du milieu sur la vitesse

Modèle	Fonction de croissance	Vitesse du front
Fisher-KPP (1)	$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + ru \left(1 - \frac{u}{K}\right)$	$v = 2\sqrt{rD}$
Effet Allee fort (2)	$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4r \frac{K}{(K - \rho)^2} u \left(1 - \frac{u}{K}\right) (u - \rho)$	$v = \sqrt{2rD} \frac{K - 2\rho}{K - \rho}$
Effet Allee faible (2)	$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4r \frac{\alpha K}{(1 + \alpha K)^2} u \left(1 - \frac{u}{K}\right) (1 + \alpha u)$	$v = \begin{cases} \frac{4\sqrt{rDK}}{1 + \alpha K} & \text{if } K \in \left(\frac{1}{\alpha}, \frac{2}{\alpha}\right) \\ \sqrt{2rD} \frac{K - 2\rho}{K - \rho} & \text{if } K \geq \frac{2}{\alpha} \end{cases}$
Dispersion DD+ (3)	$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 (D(u)u)}{\partial x^2} + ru \left(1 - \frac{u}{K}\right)$	$v = \sqrt{rDK}$

Impact de la qualité du milieu sur la vitesse

Modèle IBM

Impact de la qualité du milieu sur la vitesse

Expérience

Analyse du nombre de patches colonisés par génération:

Grand K (450): + 0.17 patch par génération

Petit K (200): + 0.13 patch par génération

Tout petit K (90): +0.05 patch par génération

Impact de la qualité du milieu sur la vitesse

Conséquences sur la dynamique d'expansion:

1. Maintien des pops dans zone de risque démographique plus longtemps (faible K , et vitesse de propagation réduite) => augmente la probabilité d'extinction
2. Dans un habitat fragmenté, difficultés à franchir les zones moins favorables => renforce l'effet négatif de la fragmentation

Barros et al. 2016 Div Distrib

Morel-Journel et al. (Ecography, in press)

Arrêts de front

Principe des dynamiques poussées: les populations nouvellement colonisées doivent grossir avant de pouvoir poursuivre la colonisation

Conséquence: la propagation est interrompue, avec des phases de croissance entre les phases de colonisation spatiale

Prédiction: les propagations poussées présentent des arrêts de la progression du front plus fréquemment que les propagations tirées

Arrêts de front

Prédiction: les propagations poussées présentent des arrêts de la progression du front plus fréquemment que les propagations tirées

Simulations

Arrêts de front

Prédiction: les propagations poussées présentent des arrêts de la progression du front plus fréquemment que les propagations tirées

Expérience

Morel-Journel et al. 2015

Données empiriques: invasion par le Bombyx disparate aux USA

Johnson et al. 2006 Nature

Arrêts de front

Fréquence des arrêts: indicateur potentiel de la nature des dynamiques

Critère dépendant du formalisme en espace discret

Probablement généralisable en pratique

-> plan d'échantillonnage/de suivi : le plus souvent discret

Dynamique de la diversité neutre

Sur un front tiré, on prédit une forte perte de diversité génétique, dûe aux phénomènes de dérive et d'effets de fondation répétés

On peut observer des allèles minoritaires au niveau du cœur qui augmentent fortement en fréquence sur le front, parfois jusqu'à la fixation

=> phénomène de « gene surfing »

Excoffier et Ray 2008 TREE

Hallatschek et al. 2007 PNAS

Dynamique de la diversité neutre

Avec modèles de réaction-diffusion

= vague tirée

Bonnefon et al. 2014 Ecological Complexity

Mélange de « génotypes » à t_0

Répartition des génotypes pendant l'expansion

Dynamique de la diversité neutre

Dans les vagues poussées: la contribution du cœur de la population à la colonisation est plus homogène => conservation de la diversité génétique

Dynamique de la diversité neutre

Comment cela se passe-t-il en conditions stochastiques? (résultats de simulations)

Haond et al. (in prep)

1. Les fronts poussés conservent plus longtemps la diversité
2. Similarité des profils effet Allee – Dispersion densité-dépendante
3. Cas limite de la propagation en « tout petit K »

Dynamique de la diversité neutre

- Conséquence 1: remise en perspective des méthodes d'analyse phylogéographique, basées sur la recherche de signatures d'expansion

Cornille et al. 2013 Molecular Ecology

Stewart et Lister 2001 TREE

- Conséquence 2: réservoir adaptatif plus grand et consanguinité plus faible sur fronts poussés
=> une piste pour expliquer le « paradoxe de l'invasion »?

Sélection sur les fronts de propagation tirés

Travaux sur la sélection sur les fronts: jusqu'ici toujours en dynamique tirée

Evolution de la dispersion: spatial sorting

Urban et al. 2008 Am Nat

Lombaert et al. 2014 JEB

Ochoki et al. 2017 Nature Com

Sélection sur les fronts de propagation tirés

Autres traits

- r/K
- densité-dépendance

Burton et al. 2010 Ecol Lett

Fronhofer et al. 2017 JEB

Weiss-Lehman et al. 2017 Nature Com

Sélection sur les fronts de propagation tirés

Phénomène de surfing: mutations non neutres peuvent également se retrouver en fréquence importante sur le front

Travis et al. 2007 Mol Biol Evol

Phillips 2015 Biol Inv

=> Populations du front:
potentiellement moins
performantes

Sélection sur les fronts de propagation poussés

En dynamique poussée:

- pas de relaxation de la densité-dépendance
- pas d'effet sur $d/r/K$

Front Coeur

Burton et al. 2010 Ecol Lett

↓ intensité de la
compétition
= poussitude

Sélection sur les fronts de propagation poussés

Projet d'évolution expérimentale: 2017-2018

3 mixes génétiques
2 modalités: tiré/poussé (dispersion +/-)

Toutes les 4 générations (G0-4-8-12):

- Fécondité
- Dispersion
- Comportement exploratoire
- Morphologie
- Diversité neutre (19 microsats)

Sur le **cœur**
et sur le
front

Début/fin (G0-G12)

- Densité-
dépendance
(fécondité +
dispersion)

Sélection sur les fronts de propagation poussés

Projet d'évolution expérimentale: résultats préliminaires

- Diversité génétique neutre: diminution plus forte du Nombre d'allèles et de l'Hétérozygotie sur les fronts tirés par rapport au cœur
- Dynamique d'expansion: vitesse + élevée, fréquence des stops plus faibles pour les vagues tirées
- Fécondité plus faible pour les vagues tirées (pas de différence cœur/front)?
- Dispersion plus forte pour les vagues tirées (pas de différence cœur/front)?
- Densité-dépendance: vagues tirées moins performantes à forte densité (mais front > cœur?)

=> Résultats mitigés, à compléter!

Vers une unification des concepts

Appropriation par la communauté des écologistes

Du continu au discret: vers plus de réalisme

Importance de la stochasticité démographique:

- EDP stochastiques (Panja 2004): vagues « weakly pushed »
- discrétisation des individus et de l'espace (IBM): apparition des arrêts de front, et de la dépendance de la vitesse à K

Les vagues tirées existent-elles?

=> Comportement asymptotique (nombre d'individus élevé, espace continu)

Du discret au continu: une question d'échelle?

Stades transitoires précoces vs dynamiques d'équilibre

Echelles temporelles et géographiques

Remerciements

S. Fellous

INRA CBGP

M. Haond

L. Lamy

E. Lombaert

A. Bertin

D. Muru

ISA
BPI

V. Calcagno

L. Mailleret

ISA
M2P2

T. Morel-Journel

UC Louvain

L. Roques

INRA PACA

BioSP