

## Devoir de Maison 3

### Exercice I

Soit  $[a, b]$  un segment de  $\mathbb{R}$  et  $x_0, x_1, \dots, x_n$ ,  $n + 1$  points distincts de  $[a, b]$ . Soit  $f$  une fonction réelle définie et continue sur  $[a, b]$ . On note  $P_k(x)$  le polynôme d'interpolation de Lagrange de  $f$  aux points  $x_0, x_1, \dots, x_k$  et  $f[x_0, \dots, x_k]$  le coefficient de son monôme de degré  $k$ , i.e.

$$P_k(x) = f[x_0, \dots, x_k] x^k + \dots$$

1. Expliquez pourquoi  $f[x_0, \dots, x_k]$  est indépendant de l'ordre de ses arguments  $x_0, \dots, x_k$ .

**Corrigé :** Le polynôme d'interpolation  $P_k$  est unique une fois les points d'interpolation  $x_0, \dots, x_k$  donnés, il en est de même de son coefficient de plus haut degré.

2. Montrez que :

$$P_k(x) - P_{k-1}(x) = f[x_0, \dots, x_k] (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1}) \quad (1)$$

**Corrigé :** Par construction les polynômes  $P_k$  et  $P_{k-1}$  vérifient  $P_k(x_i) = P_{k-1}(x_i) = f(x_i)$  pour  $0 \leq i \leq k - 1$ , donc le polynôme  $P_k - P_{k-1}$ , de degré  $k$  a pour racines les  $k$  points  $x_i$  pour  $0 \leq i \leq k - 1$ , il s'écrit donc  $\alpha(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})$ , mais son terme de plus haut degré est le même que celui de  $P_k$ , d'où le résultat.

3. En déduire que (formule de Newton) :

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1}) \quad (2)$$

**Corrigé :** En ajoutant membre à membre la relation précédente pour  $k$  de 1 à  $n$  et en remarquant que  $P_0(x) = f[x_0] = f(x_0)$  on obtient la relation demandée.

4. Soit  $k \geq 1$ , considérons le polynôme  $P_{k-1}^*(x)$  qui interpole  $f$  aux points  $x_1, \dots, x_k$  et le polynôme  $Q_k(x)$  défini par

$$Q_k(x) = \frac{(x - x_0)P_{k-1}^*(x) - (x - x_k)P_{k-1}(x)}{x_k - x_0}$$

En étudiant les propriétés de  $Q_k$  montrez que :

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0} \quad (3)$$

**Corrigé :** On vérifie que :  $Q_k(x_0) = P_{k-1}(x_0) = f(x_0)$  et que  $Q_k(x_k) = P_{k-1}^*(x_k) = f(x_k)$  et pour  $1 \leq i \leq k-1$  comme  $P_{k-1}^*(x_i) = P_{k-1}(x_i) = f(x_i)$  :  $Q_k(x_i) = f(x_i)$ . Et donc par unicité du polynôme de Lagrange  $Q_k = P_k$ , la relation demandée s'en déduit en examinant le coefficient du terme de plus haut degré de  $Q_k$ .

5. Démontrez, en utilisant la formule (1), la formule d'erreur :

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x] (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \quad (4)$$

**Corrigé :** De la formule (1) on déduit que l'expression

$$P_n(x) + f[x_0, \dots, x_n, x] (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

est la valeur en  $x$  du polynôme de degré  $(n+1)$  qui interpole  $f$  aux points  $x_0, x_1, \dots, x_n$  et  $x$ , et donc est égale à  $f(x)$ , d'où le résultat.

6. En déduire que si  $f$  est  $k$  fois continûment dérivable sur  $[a, b]$ , alors :

$$\exists \xi \in ]a, b[, f[x_0, \dots, x_k] = \frac{1}{k!} f^{(k)}(\xi)$$

**Corrigé :** Si l'on compare la formule (4) à la formule d'erreur vue en cours pour une fonction  $f$  qui est  $(n+1)$  fois continûment dérivable, soit

$$E_n(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$

on déduit que pour  $x$  différent des  $x_i$ , soit  $(n+2)$  points différents, on a :

$$f[x_0, \dots, x_n, x] = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$

d'où le résultat pour  $k$  points différents quelconques.

7. On suppose ici  $n = 3$ , décrire les calculs à mener pour passer des valeurs de la fonction  $f$  en les points  $x_i$  aux coefficients du polynôme  $P_3(x)$  dans son expression de la formule (2).

**Corrigé :** D'après la formule (3) les calculs à mener sont ceux indiqués sur la figure 1. Seuls les termes sur la ligne supérieure sont à garder pour former le polynôme.

## Exercice II




FIG. 1 – Calcul des coefficients de la formule de Newton

Soit  $[a, b]$  un segment de  $\mathbb{R}$  et  $x_0, x_1, \dots, x_n, n + 1$  points distincts de  $[a, b]$ . Soit  $f$  une fonction réelle définie et  $(n + 1)$  fois continûment dérivable sur  $[a, b]$ . On note  $P_n(x)$  le polynôme d'interpolation de Lagrange de  $f$  aux points  $x_0, x_1, \dots, x_n$  et  $\{l_i(x), 0 \leq i \leq n\}$  la base canonique de Lagrange de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur au égal à  $n$  associée aux points  $x_0, x_1, \dots, x_n$ .

1. Montrez que  $\forall x, \sum_{i=0}^n l_i(x) = 1$ .

**Corrigé :** Rappel, le polynôme d'interpolation  $P_n$  de  $f$  aux  $(n + 1)$  points  $x_i$  s'écrit  $P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x)$  et il coïncide avec  $f$  si  $f$  est un polynôme de degré inférieur ou égal à  $n$ . On obtient donc l'identité en question en considérant l'interpolation de Lagrange de la fonction  $f(x) = 1$ .

2. Montrez que pour  $1 \leq k \leq n : \forall x, \sum_{i=0}^n (x_i - x)^k l_i(x) = 0$ .

**Corrigé :** Soit  $\alpha$  un réel quelconque, considérons la fonction  $f(x) = (x - \alpha)^k$ , c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à  $n$  et donc  $(x - \alpha)^k = \sum_{i=0}^n (x_i - \alpha)^k l_i(x)$ . L'identité demandée s'en déduit en prenant  $\alpha = x$ .

3. En déduire que pour  $x \in ]a, b[$  :

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = \sum_{i=0}^n \left[ \int_{x_i}^x \frac{(x_i - t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right] l_i(x) \quad (5)$$

Indication, on rappelle la formule de Taylor avec reste intégrale :

$$f(y) = f(x) + \sum_{k=1}^{k=n} \frac{(y-x)^k}{k!} f^{(k)}(x) + \int_x^y \frac{(y-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

**Corrigé :** En développant avec la formule de Taylor les  $f(x_i)$  autour de  $x$  dans l'expression du polynôme  $P_n$  on obtient :

$$E_n(x) = f(x) - \sum_{i=0}^n \left[ f(x) + \sum_{k=1}^{k=n} \frac{(x_i - x)^k}{k!} f^{(k)}(x) + \int_x^{x_i} \frac{(x_i - t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right] l_i(x)$$

Compte tenu des relations obtenues précédemment pour les  $l_i$  il reste :

$$E_n(x) = \sum_{i=0}^n \left[ \int_{x_i}^x \frac{(x_i - t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right] l_i(x)$$

4. Pour  $n = 1$  et  $x \in ]x_0, x_1[$ , retrouvez à l'aide de la formule (5) l'existence d'un  $\xi_x \in ]x_0, x_1[$  tel que :

$$E_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2} f^{(2)}(\xi_x)$$

**Corrigé :** La formule (5) s'écrit dans ce cas particulier :

$$E_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \int_{x_0}^x (x_0 - t) f^{(2)}(t) dt + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \int_{x_1}^x (x_1 - t) f^{(2)}(t) dt$$

et en utilisant le deuxième théorème de la moyenne, avec  $\xi_0 \in ]x_0, x[$  et  $\xi_1 \in ]x, x_1[$  :

$$\begin{aligned} E_1(x) &= \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f^{(2)}(\xi_0) \int_{x_0}^x (x_0 - t) dt + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f^{(2)}(\xi_1) \int_{x_1}^x (x_1 - t) dt \\ &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2} \left[ \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} f^{(2)}(\xi_0) + \frac{(x_1 - x)}{(x_1 - x_0)} f^{(2)}(\xi_1) \right] \\ &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2} f^{(2)}(\xi_x) \end{aligned}$$

cette dernière égalité grâce au théorème des valeurs intermédiaires.