

INTÉGRATION

Exercice 1 (Inégalité de Markov). Soit f une fonction mesurable positive sur un espace (E, \mathcal{A}, μ) .

a) Montrer que pour tout $a > 0$, on a

$$\mu(f \geq a) \leq \frac{1}{a} \int_E f \, d\mu.$$

b) En déduire que $\int_E f \, d\mu = 0$ si et seulement si f est nulle μ -presque partout.

Exercice 2 (Mesures à densité). Soit (E, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré et f une fonction mesurable positive sur E . Pour tout $A \in \mathcal{A}$, on pose

$$\nu(A) := \int_E \mathbf{1}_A f \, d\mu.$$

a) Vérifier que ν est une mesure sur (E, \mathcal{A}) .

b) Montrer que pour toute fonction $h: E \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable positive, on a

$$\int_E h \, d\nu = \int_E hf \, d\mu. \quad (1)$$

c) Soit à présent $h: E \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable de signe quelconque. Montrer que $h \in L^1(E, \mathcal{A}, \nu)$ si et seulement si $hf \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ et que dans ce cas, (1) est encore vérifiée.

Exercice 3 (Équivalences). Soient μ, ν deux mesures de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Montrer que l'égalité $\mu = \nu$ est équivalente à chacune des conditions suivantes :

- $\mu((a, b)) = \nu((a, b))$ pour tout $-\infty < a < b < +\infty$
- $\int_E f \, d\mu = \int_E f \, d\nu$ pour toute fonction f mesurable positive.
- $\int_E f \, d\mu = \int_E f \, d\nu$ pour toute fonction f continue bornée.
- $\int_E f \, d\mu = \int_E f \, d\nu$ pour toute fonction f continue à support compact.

Exercice 4 (Fonction Gamma). Soit $\theta \in (0, \infty)$. On rappelle que $\Gamma(\theta) = \int_0^\infty x^{\theta-1} e^{-x} \, dx$.

a) Vérifier que pour tout $\theta \in (0, \infty)$ et tout entier $n \geq 1$, on a

$$\int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^{\theta-1} \, dx = \frac{(n!)n^\theta}{\theta(\theta+1)\cdots(\theta+n)}.$$

b) En déduire la formule d'Euler :

$$\Gamma(\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)n^\theta}{\theta(\theta+1)\cdots(\theta+n)}.$$

c) Utiliser cette formule pour calculer $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$, puis retrouver l'identité $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$.

Exercice 5 (Interversion). Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions dans $L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ telle que :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_E |f_n| \, d\mu < \infty.$$

a) Montrer que l'on peut alors intervertir l'ordre de la somme et de l'intégrale :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) \, d\mu.$$

b) En déduire les égalités suivantes :

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} \, dx = -\frac{\pi^2}{6} \quad \text{et} \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{2}} \, dx = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Exercice 6 (Lemme de Riemann-Lebesgue). Montrer que pour tout $f \in L^1(\mathbb{R})$, on a

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(nx) \, dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Exercice 7 (Dérivation sous l'intégrale). Soit (E, \mathcal{A}, μ) un espace mesuré et $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle ouvert. On considère une fonction $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme

$$F(t) := \int_E f(t, x) \, \mu(dx),$$

où $f: I \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction qui vérifie les conditions suivantes :

- (i) Pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(t, x)$ est dans $L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$;
- (ii) Pour μ -presque tout $x \in E$, la fonction $t \mapsto f(t, x)$ est de classe C^1 sur I ;
- (iii) Il existe $g \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ telle que pour tout $t \in I$ et μ -presque tout $x \in E$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \right| \leq g(x).$$

Montrer que F est de classe C^1 sur \mathbb{R} et que pour tout $t \in I$,

$$F'(t) = \int_E \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) \, \mu(dx).$$

Exercice 8 (Équation différentielle). On cherche à évaluer, pour tout $t \in \mathbb{R}$, l'intégrale

$$F(t) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \cos(tx) \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\} \, dx.$$

Montrer que F vérifie l'équation différentielle $F'(t) = -tF(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$, puis conclure.

Exercice 9 (Autre application). On cherche à évaluer, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, l'intégrale

$$F(t) := \int_0^{\infty} \frac{1 - e^{-tx^2}}{x^2} \, dx.$$

Montrer que F est dérivable sur $(0, \infty)$ et calculer sa dérivée, puis conclure.